

| Folfiri

In samenspraak met uw arts is er beslist om chemotherapie met Folfiri te starten. Hiervoor dient u **niet** te overnachten of nuchter te zijn.

Samenstelling therapie

Folfiri bestaat uit een combinatie van Irinotecan, Levofolic® en 5-Fluorouracil (5-FU). Levofolic is geen chemotherapie, maar zorgt ervoor dat de 5-FU beter opgenomen wordt in uw lichaam en zo de werking versterkt.

Verloop therapie

Deze therapie wordt via uw poortkatheter (PAC) toegediend. Nadat de verpleegkundige uw poortkatheter heeft aangeprikt en er een bloedanalyse is gebeurd, wordt uw cystotica klaargemaakt in de apotheek.

Voor de start van de chemotherapie wordt via het infuus medicatie tegen misselijkheid en braken gegeven. U krijgt ook corticoiden ter preventie van acute bijwerkingen. Een lage dosis Atropine® wordt gegeven ter preventie van bijwerkingen die kunnen optreden bij de toediening van Irinotecan (zweeten, buikpijn, diarree, tranenvloed, overvloedige speekselproductie en gezichtsstoornissen).

De Irinotecan en Leucovorin worden tegelijkertijd toegediend over 2 uur, de 5-FU wordt nadien toegediend over 10 minuten.

Aan het einde van de toediening wordt een dosis 5-FU via een pompje met bijgeleverd heuptasje aangekoppeld. Dit pompje loopt gedurende 48 uur via de poortkatheter. Hierna dient het pompje door de thuisverpleging afgeschakeld te worden. Het pompje dient na afschakelen te worden verpakt in een dubbele plastic zak en in een open ruimte worden bewaard (buiten bereik van kinderen bewaren). Het heuptasje dient worden hergebruikt en meegebracht bij uw volgende behandeling. Na het afkoppelen van de infuuspomp volgen er 10 dagen rust vooraleer een nieuwe kuur gestart wordt.

Uw arts zal met u het aantal toedieningen bespreken. Na drie toedieningen gebeurt er een herevaluatie door middel van een gericht bloedonderzoek en al dan niet een radiologisch onderzoek. De resultaten worden met u besproken op de consultatie.

Schematische voorstelling van de therapie:

Generieke naam	Merknaam	Dag			Wijze van toediening
		1	2	3	
Irinotecan	Campto	dagkliniek			Infuus over 1 uur
Leucovorine	Elvorine	dagkliniek			Infuus over 2 uur
Fluracedyl	Fluoro(5)-uracil	dagkliniek			Infuus over 10 minuten
Fluracedyl	Fluoro(5)-uracil	dagkliniek	pomp thuis	pomp thuis	Pomp over 48 uur

De toediening gebeurt 1x om de 14 dagen. De toedieningstijd is niet gelijklopend aan het verblijf in het dagziekenhuis.

Mogelijke nevenwerkingen

- Misselijkheid en braken
- Diarree
- Tijdelijke onderdrukking van het beenmerg met verminderde bloedaanmaak
= bloedarmoede, vatbaarder voor infecties
- Vermoeidheid

Wanneer u te kampen krijgt met diarree kan er zo nodig Imodium® worden opgestart. Soms is een uitstel of dosisaanpassing van de therapie noodzakelijk bij nevenwerkingen en/of afwijkende bloedresultaten.

Minder frequente nevenwerkingen

- Pijnlijke ontsteking van het mondslijmvlies
- Haaruitval
- Krampende pijn in de borstkas
- Hand-voetsyndroom (droge, rode handen en voeten)

Het is zeer belangrijk dat u zowel de arts als de verpleegkundige voor de start van de volgende toediening op de hoogte brengt van mogelijke bijwerkingen. Hiervoor maakt u gebruik van uw dagboek symptoomlast, dat u aangeboden krijgt door de verpleegkundige bij de start van uw therapie.

Wat kan u zelf doen?

- Huid hydrateren
- Imodium® tegen diarree nemen indien nodig. Ook de voeding kan aangepast worden, hiervoor staat een diëtiste ter beschikking op de dienst.

Contacteer onmiddellijk uw (huis-)arts wanneer

- u aanhoudende krampende pijn en/of druk heeft in de borstkas.
- u na inname van één paracetamol 500mg blijvende koorts (vanaf 38°C) en/of rillingen hebt.
- u langer dan 2 dagen diarree heeft ondanks inname Imodium®.
- u diarree heeft en ook moet braken.
- u last heeft van een branderig gevoel aan de aars.
- u bloed in het braaksel, urine of de stoelgang ziet.
- uw stoelgang zwart kleurt.
- u zich duizelig voelt, kortademig bent, pijn heeft op de borstkas.
- er spontaan blauwe plekken ontstaan en u regelmatig een moeilijk te stelpen bloedneus heeft.
- u verandering waarneemt in uw mondslijmvlies: blaasjes, zweertjes, droge mond, witte stipjes.
- u niet meer voldoende kan eten en drinken.
- u ernstig vermagerd bent (op korte tijd veel gewicht verliezen).
- u zich uitgesproken moe voelt en uw dagdagelijkse activiteiten niet meer kunt uitvoeren.

Omkadering

Het multidisciplinair team bestaat uit artsen, verpleegkundig specialisten, een onco-coach, een psychologe, een sociaal verpleegkundige en diëtisten die nauw samenwerken om u en uw familie zo goed mogelijk te begeleiden. In de loop van uw traject komt u met elk van hen in aanraking.

Er is een gedeeltelijke terugbetaling van reisonkosten voor de verplaatsing die u maakt voor behandelingen en consultaties. De aanvraag hiervoor gebeurt via een specifiek formulier dat u ontvangt bij start van de behandeling op het dagziekenhuis. Een parkeerticket wordt elke behandelingsdag gratis gevalideerd.

Neem de dag voor opname telefonisch contact op met het dagziekenhuis om uw al dan niet aanwezigheid te bevestigen. U krijgt dan ook het uur dat u verwacht wordt op de dienst toegewezen.

Succes met de behandeling!