

| Carbo-Gemcitabine

In samenspraak met uw arts is er beslist om de chemotherapie carbo-gemcitabine op te starten. Voor deze infusie hoeft u **niet** te overnachten, evenmin nuchter te zijn.

Samenstelling therapie

Deze therapie bestaat uit twee verschillende celremmende geneesmiddelen: Carboplatine en Gemcitabine.

Verloop therapie

Voor de start van de chemotherapie zal er telkens een bloedafname gebeuren en wordt er via het infuus medicatie toegediend ter preventie van acute bijwerkingen.

Schematische voorstelling van de therapie:

Generieke naam	Merksnaam	Dag				Wijze van toediening
		1	2-7	8	9-14	
Gemcitabine	Gemzar®	dagkliniek	rust	dagkliniek	rust	Infuus over 60 min
Carboplatine	Paraplatin®	dagkliniek	rust	dagkliniek	rust	Infuus over 60 min

De toedieningstijd is **niet** gelijklopend aan het verblijf in het dagziekenhuis.

Mogelijke nevenwerkingen

- Misselijkheid en braken
- Tijdelijke onderdrukking van het beenmerg met verminderde bloedaanmaak
- Vermoeidheid
- Slijmvliesontstekingen in mond (aften) en darmen (diarree)
- Verandering van smaak
- Verminderde eetlust
- Perifere neuropathie

Het is zeer belangrijk dat u zowel de arts als de verpleegkundige voor de start van de volgende toediening op de hoogte brengt van mogelijke bijwerkingen.

Wat kan u zelf doen?

Zolang de behandeling loopt - ook thuis - vermijdt u best blootstelling aan koude, dit voor de perifere neuropathie. Hiermee wordt bedoeld dat u extra voorzichtig moet zijn wanneer u bijvoorbeeld iets uit de koelkast of diepvriezer neemt.

Contacteer onmiddellijk uw (huis-)arts wanneer

- u aanhoudende krampende pijn en/of druk heeft in de borstkas.
- u na inname van één paracetamol 500mg blijvende koorts (vanaf 38°C) en/of rillingen hebt.
- u langer dan 2 dagen diarree heeft ondanks inname Imodium®.
- u diarree heeft en ook moet braken.

- u last heeft van een branderig gevoel aan de aars.
- u bloed in het braaksel, urine of de stoelgang ziet.
- uw stoelgang zwart kleurt.
- u zich duizelig voelt, kortademig bent, pijn heeft op de borstkas.
- er spontaan blauwe plekken ontstaan en u regelmatig een moeilijk te stelpen bloedneus heeft.
- u verandering waarneemt in uw mondslijmvlies: blaasjes, zweertjes, droge mond, witte stipjes.
- u niet meer voldoende kan eten en drinken.
- u ernstig vermagerd bent (op korte tijd veel gewicht verliezen).
- u zich uitgesproken moe voelt en uw dagdagelijkse activiteiten niet meer kan uitvoeren.

Omkadering

Het multidisciplinair team bestaat uit artsen, verpleegkundig specialisten, een onco-coach, een psychologe, een sociaal verpleegkundige en diëtisten die nauw samenwerken om u en uw familie zo goed mogelijk te begeleiden. In de loop van uw traject komt u met elk van hen in aanraking.

Er is een gedeeltelijke terugbetaling van reiskosten voor de verplaatsing die u maakt voor behandelingen en consultaties. De aanvraag hiervoor gebeurt via een specifiek formulier dat u ontvangt bij start van de behandeling in het dagziekenhuis. Een parkeerticket wordt elke behandelingsdag gratis gevalideerd.

Neem de dag voor opname telefonisch contact op met het dagziekenhuis om uw al dan niet aanwezigheid te bevestigen. U krijgt dan ook het uur dat u verwacht wordt op de dienst toegewezen.

Succes met de behandeling!