

| Panitumumab (Vectibix®)

In samenspraak met uw arts is er beslist om u de infusievloeistof Panitumumab te geven. Voor deze infusie hoeft u **niet** te overnachten, evenmin nuchter te zijn.

Samenstelling therapie

Panitumumab is een monoklonale therapie die zich vasthecht aan een bepaald eiwit dat zich op de abnormale cellen bevindt. Hierdoor wordt de groei van deze cellen afgeremd.

Verloop therapie

Panitumumab wordt 1 keer om de 14 dagen toegediend. De inlooptijd is 60 minuten. De toedieningstijd is **niet** gelijklopend aan het verblijf in het dagziekenhuis.

Mogelijke nevenwerkingen

- Lage bloeddruk
- Huiduitslag/nagelverandering
 - Vanaf enkele dagen na de aanvang van de behandeling:*
Acne-achtige huiduitslag op het gelaat, hoofdhaar, hals, borst en rug. Deze kunnen soms jeuken of pijnlijk aanvoelen
 - Na een vijftal weken*
Droge huid op armen, benen en door de acne aangetaste delen. Soms ontstaan t.g.v. de droge huid eczema en kloven
 - Bij langdurige behandeling (na 10 weken)*
Kloven in vingers en hielen, droge slijmvliezen (vaginaal, rode ogen)
 - Na 4-8 weken behandeling*
Nagelbedontsteking (tenen en/of vingers). Kan lijken op een ingroeide nagel.
 - Andere huidreacties*
bruine verkleuring van de huid, gesprongen haarvaatjes, verandering van beharing (lange wimpers, mild haarverlies, tragere groei baard,...)
De ernst van de symptomen verschillen van persoon tot persoon. Sommige ontwikkelen een ernstige vorm van acne, bij de meerderheid zijn de symptomen milder.
- Ademhalingsmoeilijkheden (vooral tijdens de infusie)
- Allergische reactie
- Spierkrampen (magnesium tekort)

Het is zeer belangrijk dat u zowel de arts als de verpleegkundige voor de start van de volgende toediening op de hoogte brengt van mogelijke bijwerkingen.

Wat kan u zelf doen?

- Wanneer een verlaagde bloeddruk aanhoudt, dient u de arts te contacteren.
- Huidvriendelijke adviezen:
 - * Zeep droogt uit, gebruik daarom zeepvervangers.
 - * Vermijd heet water en zonlicht (droogt huid uit).
 - * Gebruik hydraterende producten op uw armen/benen. Opgelet: gebruik deze niet op de plaatsen met acne!
 - * Om de acne te bedekken mag u fond de teint aanbrengen. Deze verwijdert u best met een zachte lotion.
 - * Gebruik geen vrij te verkrijgen anti-acneproducten.

- * Vraag steeds advies aan de verpleging in het dagziekenhuis, aan de onco-coach of de behandelende arts voor bijkomende ondersteuning wat betreft uw huid.

Contacteer onmiddellijk uw (huis-)arts wanneer

- u na inname van één paracetamol 500mg blijvende koorts (vanaf 38°C) en/of rillingen hebt.
- de nevenwerkingen erger worden en uw normaal functioneren hierdoor in het gedrang komt.
- u niet meer voldoende kan eten en drinken.
- u ernstig vermagerd bent (op korte tijd veel gewicht verliezen).
- u zich uitgesproken moe voelt en uw dagdagelijkse activiteiten niet meer kunt uitvoeren.

Omkadering

Het multidisciplinair team bestaat uit artsen, verpleegkundig specialisten, een onco-coach, een psychologe, een sociaal verpleegkundige en diëtisten die nauw samenwerken om u en uw familie zo goed mogelijk te begeleiden. In de loop van uw traject komt u met elk van hen in aanraking.

Er is een gedeeltelijke terugbetaling van reisonkosten voor de verplaatsing die u maakt voor behandelingen en consultaties. De aanvraag hiervoor gebeurt via een specifiek formulier dat u ontvangt bij start van de behandeling op het dagziekenhuis. Een parkeerticket wordt elke behandelingsdag gratis gevalideerd.

Neem de dag voor opname telefonisch contact op met het dagziekenhuis om uw al dan niet aanwezigheid te bevestigen. U krijgt dan ook het uur dat u verwacht wordt op de dienst toegewezen.

Succes met de behandeling!