

# Cetuximab (Erbix®)

In samenspraak met uw arts is er beslist om cetuximab op te starten. Voor deze infusie hoeft u **niet** te overnachten, evenmin nuchter te zijn.

## Samenstelling therapie

Cetuximab is een monoclonale therapie die zich vasthecht aan een bepaald eiwit die zich op abnormale cellen bevindt. Hierdoor wordt de groei van deze cellen afgeremd.

## Verloop therapie

Cetuximab wordt via een infuus gegeven over 60 minuten. De toedieningstijd is **niet** gelijklopend aan het verblijf op het dagziekenhuis.



## Mogelijke nevenwerkingen

- Lage bloeddruk
- Huiduitslag/nagelverandering
  - Vanaf enkele dagen na de aanvang van de behandeling:*  
Acne-achtige huiduitslag op het gelaat, hoofd, hals, borst en rug. Deze kunnen soms jeuken of pijnlijk aanvoelen
  - Na een vijftal weken*  
Droge huid op armen, benen en door de acne aangetaste delen. Soms ontstaan t.g.v. de droge huid eczema en kloven
  - Bij langdurige behandeling (na 10 weken)*  
Kloven in vingers en hielen, droge slijmvliezen (vaginaal, rode ogen)
  - Na 4-8 weken behandeling*  
Nagelbedontsteking (tenen en/of vingers). Kan lijken op een ingroeide nagel.
  - Andere huidreacties*  
bruine verkleuring van de huid, gesprongen haarvaatjes, verandering van beharing (lange wimpers, mild haarverlies, tragere groei baard,...)
- De ernst van de symptomen verschillen van persoon tot persoon. Sommige ontwikkelen een ernstige vorm van acne, bij de meerderheid zijn de symptomen milder.
- Ademhalingsmoeilijkheden (vooral tijdens de infusie)
- Allergische reactie
- Spierkrampen (magnesiumtekort)

Het is zeer belangrijk dat u zowel de arts als de verpleegkundige voor de start van de volgende toediening op de hoogte brengt van mogelijke bijwerkingen.

## Wat kan u zelf doen?

- Wanneer een verlaagde bloeddruk aanhoudt, dient u de arts te contacteren.
- Huidvriendelijke adviezen:
  - \* Zeep droogt uit, gebruik daarom zeepvervangers.
  - \* Vermijd heet water en zonlicht (droogt huid uit).
  - \* Gebruik hydraterende producten op uw armen/benen. Opgelet: gebruik deze niet op de plaatsen met acne!

- \* Om de acne te bedekken mag u fond de teint aanbrengen. Deze verwijdert u best met een zachte lotion.
- \* Gebruik geen vrij te verkrijgen anti-acneproducten.
- \* Vraag steeds advies aan de verpleging op de dagkliniek, de onco-coach of de behandelende arts voor bijkomende ondersteuning wat betreft uw huid.

### Contacteer onmiddellijk uw (huis-)arts wanneer

- u na inname van één paracetamol 500mg blijvende koorts (vanaf 38°C) en/of rillingen heeft.
- er spontaan blauwe plekken ontstaan en u regelmatig een moeilijk te stelpen bloedneus heeft.
- u verandering waarneemt in uw mondslijmvlies: blaasjes, zweertjes, droge mond, witte stipjes.
- u niet meer voldoende kan eten en drinken.
- u ernstig vermagerd bent (op korte tijd veel gewicht verliezen).
- u zich uitgesproken moe voelt en uw dagdagelijkse activiteiten niet meer kan uitvoeren.
- er zich uitvalsverschijnselen voordoen.

### Omkadering

Het multidisciplinair team bestaat uit artsen, verpleegkundig specialisten, een onco-coach, een psychologe, een sociaal verpleegkundige en diëtisten die nauw samenwerken om u en uw familie zo goed mogelijk te begeleiden. In de loop van uw traject komt u met elk van hen in aanraking.

Er is een gedeeltelijke terugbetaling van reisonkosten voor de verplaatsing die u maakt voor behandelingen en consultaties. De aanvraag hiervoor gebeurt via een specifiek formulier dat u ontvangt bij start van de behandeling in het dagziekenhuis. Een parkeerticket wordt elke behandelingsdag gratis gevalideerd.

**Neem de dag voor opname telefonisch contact op met het dagziekenhuis om uw al dan niet aanwezigheid te bevestigen. U krijgt dan ook het uur dat u verwacht wordt op de dienst toegewezen.**

Succes met de behandeling!