



**A.S.Z.**  
ZIEKENHUIS



Informatiebrochure

**Aerochamber®**

| Autonome verzorgingsinstelling

# I Informatie voor ouders

Beste ouder(s),

Uw kind dient op advies van de kinderarts puffs via de **AeroChamber®** (= voorzetkamer) toegediend te krijgen. Met deze informatiefolder willen we wat meer uitleg geven over het correct gebruik van de AeroChamber®.

Bij kinderen heeft de behandeling van astma door **inhalatietherapie** de voorkeur boven de andere toedieningsvormen. Om medicatie (zoals Ventolin®, Flixotide®, ...) zo goed mogelijk vanuit een dosisaerosol te inhaleren, wordt geadviseerd een voorzetkamer (bv. AeroChamber®) te gebruiken. Correct gebruik van deze voorzetkamer is uitermate belangrijk.



# I Gebruik van de AeroChamber®

- Schud de dosis-aerosol (of spuitbusje) voor gebruik (om het medicijn met het drijfgas te kunnen mengen)
- Verwijder het beschermkapje van de verstuiver
- Plaats de dosis-aerosol in de AeroChamber®. De puffer met het geneesmiddel is naar boven gericht
- Plaats het kind op uw schoot met het hoofd iets achterover
- Houd de AeroChamber® horizontaal en plaats het gezichtsmasker over de mond en neus van uw kind. Zorg ervoor dat het masker goed aansluit en druk het stevig aan
- Druk eenmaal op de puffer zodat een dosis wordt verstoven. Laat het kind 10 maal in- en uitademen door de AeroChamber®, zonder het masker weg te nemen
- Indien u meerdere pufjes dient te geven, dient u de telkens opnieuw te schudden aerosol uit de AeroChamber® en plaats kapje op de verstuiver na gebruik de mond spoelen of een slokje eventie van schimmelinfecties in de mond

## rhoud van de Chamber®



uik van de AeroChamber® is het eze eenmaal per week te reinigen met een an vloeibaar afwasmiddel en lauw water.

masker en de rubberring van de

15 minuten weken

- Spoel de inhalatiekamer met lauw-warm water, zonder zeep

- Laat de AeroChamber® verticaal drogen aan de lucht. Niet droogwrijven (anders wordt deze statisch en slaan de medicijnen neer tegen de wand). Het masker kan u ook gewoon afspoelen
- Zet de AeroChamber® terug in elkaar eenmaal alles helemaal droog is.



© AeroChamber

## I Bijkomende tips

- Indien uw kind zowel een luchtwegverwijder (bv. Ventolin®) als een luchtwegbeschermer (bv. Flixotide®) gebruikt, hou dan rekening met de volgorde van de medicijnname: eerst de luchtwegverwijder en na 15 minuten de luchtbeschermer
- Bewaar de dosis-aerosol op kamertemperatuur.
- Om te controleren of er medicatie in het spuitbusje zit, kunt u hiermee - na goed schudden - tegen een spiegel spuiten. Verschijnt er een zichtbaar wit randje op de spiegel, dan zit er nog voldoende geneesmiddel in. Let ook steeds op de vervaldatum!

ASZ

**CAMPUS AALST PEDIATRIE**

Merestraat 80

9300 Aalst

T +32 (0)53 76 47 00

**CAMPUS GERAARDSBERGEN PEDIATRIE**

Gasthuisstraat 4

9500 Geraardsbergen

T +32 (0)54 43 21 11 (raadplegingen via onthaal)

**CAMPUS WETTEREN PEDIATRIE**

Wegvoeringstraat 73

9230 Wetteren

T +32 (0)9 368 82 26

