



A.S.Z.
ZIEKENHUIS



Informatiebrochure

Ceftriaxon

| Autonome verzorgingsinstelling

I Intraveneuze antibiotica met ceftriaxon

Je gaat naar huis na een ziekenhuisopname en jouw intraveneuze antibioticatherapie voor de behandeling van een bacteriële infectie dient thuis verdergezet te worden. De verderzetting van jouw therapie in jouw thuissituatie kadert binnen het zorgprogramma OPAT.

OPAT staat voor 'Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy' of ambulante parenterale therapie.

- **Ambulant:** de therapie wordt niet toegediend tijdens een ziekenhuisopname, maar thuis of via het dagziekenhuis.
- **Parenteraal:** de toediening gebeurt rechtstreeks in de bloedbaan via een katheter.
- **Antimicrobiële therapie:** geneesmiddelen (bv. antibiotica) die worden gebruikt bij de behandeling van infecties die veroorzaakt worden door micro-organismen zoals bacteriën, virussen en schimmels.

Je wordt behandeld met ceftriaxon. Ceftriaxon is een antibioticum voor de behandeling van een bacteriële infectie. Het werkt bacteriedodend door de aanmaak van de celwand van de bacteriën te verstoren.

Welke dosis moet je krijgen?

Je krijgt een dosis toegediend van 2 gram ceftriaxon 1 à 2 per dag. Dit is afhankelijk van het type infectie en wordt beslist door jouw behandelend arts. Bij patiënten met een verminderde nierfunctie wordt de dosis mogelijks aangepast.

Hoe wordt ceftriaxon toegediend?

Het geneesmiddel wordt éénmaal of tweemaal per dag toegediend via een korte intraveneuze infusie gedurende 15 minuten. De duur van de therapie is afhankelijk van het type infectie. De therapie zal steeds opgestart worden tijdens jouw verblijf in het ziekenhuis. De verderzetting van jouw therapie gebeurt thuis door de thuisverpleegkundige. Deze zal éénmaal of tweemaal per dag het infuus met de antibiotica bij jou thuis bereiden en toedienen via jouw katheter.

Het antibioticum en de nodige materialen worden bij jouw ontslag meegegeven vanuit de ziekenhuisapothek. Er wordt een bereidings- en toedieningsprotocol meegegeven voor de thuisverpleegkundige.

Hoe wordt je therapie opgevolgd?

Je komt regelmatig terug naar het ziekenhuis voor controle van de therapie en voor een klinisch onderzoek. Er gebeurt ook regelmatig op vraag van jouw arts een controle bloedonderzoek.

Hoe wordt ceftriaxon bewaard?

Niet-aangeprikte flacons dienen koel en droog bewaard te worden bij een kamertemperatuur minder dan 30°C. Bewaar ze op een veilige plek en buiten het bereik van kinderen. Oplossingen van ceftriaxon moeten altijd net voor toediening bereid worden en mogen niet bewaard worden.

Kunnen er bijwerkingen optreden?

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

- Hoofdpijn, tintelingen en/of spiersamentrekkingen
- Diarree, misselijkheid, braken en verteringsproblemen
- Aderontsteking (rode, pijnlijke, gezwollen huid op de plaats van de katheter) door de intraveneuze toediening
- (Jeukende) uitslag van de huid

Het optreden van bijwerkingen heeft geen invloed op het effect van de behandeling, maar je dient wel jouw (huis)arts of thuisverpleegkundige te verwittigen als je bijwerkingen ervaart.

Als je een ontsteking opmerkt t.h.v. de huid rond de katheter, moet je steeds en onmiddellijk je arts / thuisverpleegkundige contacteren!

Wat met andere geneesmiddelen?

Meld aan jouw behandelend arts welke andere geneesmiddelen, vitaminen, voedingssupplementen en dergelijke je gebruikt (zowel voorgeschreven middelen als middelen die je op eigen initiatief neemt).

Enkele aandachtspunten

- Indien je een gekende overgevoeligheid hebt voor bepaalde antibiotica, dan meld je dit steeds aan jouw behandelend arts. Ceftriaxon dient met voorzichtigheid toegediend te worden bij patiënten met een gekende overgevoeligheid voor o.a. penicilline.
- Bij het optreden van ernstige reacties zoals huiduitslag, jeuk, gevoel van benauwdheid, lage bloeddruk, koorts of rillingen, en opgezwollen lippen, tong of keel, moet je onmiddellijk jouw huisarts verwittigen of naar de spoedgevallendienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaan.
- Wanneer je een voorgeschiedenis hebt van verminderde nierfunctie, moet je dit steeds melden aan jouw behandelend arts.
- Als je aanhoudende of ernstige diarree krijgt, ook na het stoppen van de kuur antibiotica, moet je dadelijk jouw huisarts waarschuwen.
- Meet regelmatig je lichaamstemperatuur, bij voorkeur op hetzelfde tijdstip en best 's avonds. Als je temperatuur hoger is dan 38.5°C, neem je steeds contact op met jouw huisarts of behandelend arts in het ziekenhuis.

Wanneer en met wie moet je contact opnemen?

Spoedgevallendienst

- Bij signalen van een ernstige allergische reactie, ernstige diarree, huiduitslag of bloedingen.
- Bij hoge temperatuur en/of rillingen.

(Huis)arts

- Bij temperatuur, hoofdpijn, keelpijn, buikkrampen,...
- Bij signalen van een milde allergische reactie
- Bij optreden van roodheid rond de katheter

Thuisverpleegkundige

- Bij katheter problemen: zwelling, een pijnlijke ader, roodheid, een warm gevoel en/of pijn rond de katheter.

Kan je jouw (huis)arts en/of thuisverpleegkundige niet bereiken, dan contacteer je bij enige twijfel steeds een arts van de spoedgevallendienst.

Nuttige contacten

DIENST INFECTIEZIEKTEN A.S.Z.

T 053/76 41 17 of 053/76 47 77

SPOEDGEVALLENDIENST A.S.Z.

- Aalst T 053/76 40 06

- Geraardsbergen T 054/43 27 05

APOTHEEK A.S.Z.

- Aalst T 053/76 48 54

- Geraardsbergen T 054/43 21 60

- Wetteren T 09/368 8230

E OPAT@asz.be



A. S.Z. © 25 november 2022, 02082-NL